

FRUTALES

MANZANO Y PERAL

MOTEADO

Venturia inaequalis y *V. pyrina*

A partir de estos momentos hay riesgo de infecciones primarias de Moteado si se dan las condiciones climáticas favorables para la enfermedad, es decir lluvias y temperaturas suaves. El hongo, que inverna en las hojas enfermas caídas el otoño pasado, forma ascosporas que a partir de ahora comienzan a madurar y que saldrán al exterior y se diseminan cuando se produzca la primera lluvia. Esta salida de ascosporas prosigue hasta finales de abril, siendo éste el período de riesgo de infecciones primarias si coincide con lluvias o con rocíos frecuentes. A partir del mes de mayo las infecciones nuevas (secundarias) se producen por los conidios que se forman en las manchas de Moteado procedentes de las infecciones primarias. Para los dos tipos de infección es necesario que el árbol permanezca mojado durante un tiempo que varía con la temperatura y por lo tanto será

necesario intervenir después de cada lluvia o periódicamente si el mojado es causado por rocíos cotidianos.

Los tratamientos pueden dividirse en 3 tipos: los **preventivos** que se efectúan con tiempo seco en previsión de que llueva o haya rocío, los denominados de "**stop**" que se efectúan en las 36 horas posteriores al comienzo de la lluvia con fungicidas penetrantes y los **curativos**, que se hacen con fungicidas penetrantes o sistémicos capaces de impedir la progresión del hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia.

Al llegar al estado C/C₃ (oreja de ratón) es imprescindible comenzar los tratamientos preventivos con fungicidas de contacto, sobre todo en las variedades más sensibles de manzano (Verde Doncella, grupo Golden, grupo Gala, Delicious rojas y sus mutantes) y de peral (Blanquilla, Castell, Magallón).

SESIA Y ZEUZERA

Synanthedon myopaeformis y *Zeuzera pyrina*

Efectuar antes de la floración un tratamiento localizado en los chancros de sesia y en los orificios de salida de excrementos de zeuzera con una mezcla de aceite de verano al 1% y un **piretroide** o **fosalon** o **triclorfon**.

MANZANO

ORUGAS DE LA PIEL Y PULGÓN OSCURO

Adoxophyes orana, *Pandemis heparana* y *Dysaphis plantaginea*

En el estado de botón blanco (E/E₃) tratar contra pulgón oscuro con uno de los siguientes neonicotinoides: **acetamiprid** (EPIK-Sipcam Inagra), **imidacloprid** (varias casas), **tiaclorid** (CALYPSO-Bayer) o **tiametoxam** (ACTARA-Syngenta), teniendo en cuenta que imidacloprid es muy tóxico para las abejas.

Si se observa la presencia de orugas de la piel, utilizar cuando hayan caído los pétalos **fenoxicarb** (varias casas).

OÍDIO

Podosphaera leucotricha

Las infecciones primarias comienzan en el estado E/E₃. Iniciar los tratamientos sistemáticos en ese momento y repetirlos cada 2 semanas durante la primavera. Pueden utilizarse los fungicidas incluidos en el cuadro de moteado con la anotación de eficacia contra oídio y además las siguientes materias activas: **azufre**, **azufre + miclobutanil** (THIOCUR COMBI-Dow AgroSciences), **bupirimato** (NIMROD-Aragonesas), **penconazol**, **triadimenol** o **triflumizol** (TRIFMINE-Sipcam Inagra)

PERAL

PULGÓN OSCURO, HOPLOCAMPA Y ORUGAS DE LA PIEL

Dysaphis piri, *Hoplocampa brevis*, *Adoxophyes orana* y *Pandemis heparana*

Inmediatamente después de que hayan caído los pétalos efectuar un tratamiento para prevenir los daños de estos insectos utilizando los siguientes productos fitosanitarios en función de las plagas presentes o más importantes.

Materia activa	Nombre y Casa comercial	Toxicidad	P. S. (1)
Tratamientos preventivos			
captan	VIARIOS-Varias	Xn/T, B	10
compuestos de cobre	VIARIOS-Varias	-/Xn, A/B/C	15
folpet	VIARIOS-Varias	Xn, A/B	10/15
mancozeb (3) (4)	VIARIOS-Varias	Xi/Xn, D	28
maneb (3) (4)	VIARIOS-Varias	Xi/Xn, D	28
metiram (4)	POLYRAM DF-Basf	Xn, -	28
propineb (4)	ANTRACOL 70 PM-Bayer	Xn, -	28
tiram	VIARIOS-Varias	Xn, A	15
ziram (3)	VIARIOS-Varias	T, A/B	28
Tratamientos de "stop"			
clortalonil	VIARIOS-Varias	Xn/T/T, A	15
ditianona	VIARIOS-Varias	Xn, -	21
dodina	VIARIOS-Varias	-/Xi/Xn/T, B	15
Tratamientos curativos			
bitertanol (2)	BAYCOR 25-Bayer	Xi, -	15
ciproconazol (2) (3)	CADDY 10 PEPITE-Bayer	Xn, B	14
difenoconazol (2) (3)	VIARIOS-Varias	Xi/Xn, B	14
diniconazol (2)	VIARIOS-Varias	-/Xn, C	7
fluquinconazol (2)	CASTELÁN-Basf	Xn, A	21
flusilazol (2)	NUSTAR 40 EC-DuPont	T, -	14
flutriafol (2) (6)	IMPACT-Agrodán	Xn, B	14
hexaconazol (2) (5)	VIARIOS-Varias	Xi, B	21
kresoxim metil (2)	STROBY-Basf	Xn, -	35
miclobutanil (2)	VIARIOS-Varias	Xn, A	28
tebuconazol (2)	FOLICUR 25 WG-Bayer	Xn, A	14
tetraconazol (2)	VIARIOS-Varias	-/Xn, A	14
trifloxistrobin (2)	FLINT-Bayer	Xi, -	14

- (1) Plazo de seguridad en días (2) Eficaz contra oídio del manzano (3) Eficaz contra roya del peral (4) Fitotóxico en blanquilla y mantecosas (5) Sólo hasta el 31 de mayo (6) No autorizado en peral



UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural



Departamento de Agricultura
y Alimentación

Materia activa	Nombre y Casa comercial	Pulgón oscuro	Hoplo-campa	Orugas piel	Toxicidad
acetamiprid	EPIK-Sipcam INATRA GAZEL-Basf Española	++			Xn, -
clorpirifos (2)	VIARIOS-Varias	+		++	Xi/Xn/T, B/D
fenoxicarb	VIARIOS-Varias			++	-/Xi, B
imidacloprid	VIARIOS-Varias	++			-/Xi/Xn, D
metil clorpirifos	RELDAN E-Dow AgroSc.	+	++	++	Xn, C
metomilo	VIARIOS-Varias	+	++	++	Xn/T/T+, B/C
tiacloprid	CALYPSO-Bayer	++			Xn, -

- (1) Plazo de seguridad en días. + = eficacia media
 (2) Sólo formulaciones CS, WG y WP. ++ = eficacia alta
 (3) Formulaciones SC 15 días.

SILA O MIELETA

Psylla piri

Cuando hayan caído todos los pétalos se debe tratar con **abamectina** (varias casas). A lo largo del resto de la primavera y durante todo el verano es conveniente utilizar **fosmet** para la lucha contra *Carpocapsa* dada su eficacia contra sila. Cuando la presión de esta plaga sea muy alta recomendamos el uso de **aceite de verano + abamectina + fenoxicarb** o **aceite de verano + abamectina + fosmet**. En todo caso los tratamientos contra sila deben efectuarse utilizando altos volúmenes de caldo por hectárea, con un mínimo de 1.200 litros y llegando a 1.500 ó 1.800 en el caso de árboles de más de 3 metros de altura.

SEPTORIOSIS Y STEMPHYLIUM

Septoria piricola y *Stemphylium vesicarium*

Las variedades poco sensibles a moteado deben protegerse contra septoriosis en años de lluvias frecuentes o en ubicaciones propensas a rocíos. Para ello les recomendamos el uso de **difenoconazol**, **metil tiofanato** o **ziram** durante la primavera.

En cuanto a *Stemphylium*, también conocido como mancha negra, afecta a la variedad Conferencia y peras de invierno, habiéndose detectado en años anteriores en plantaciones cercanas a riberas de río o zonas húmedas en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Calatayud. La lucha contra esta enfermedad requiere aplicaciones sistemáticas cada 14 días desde la caída de los pétalos hasta la recolección con los siguientes fungicidas: **captan** (sólo formulación 80 WG, 10 días de plazo de seguridad), **ciprodinil + fludioxonil** (14 días), **iprodiona** (sólo formulación 50 SC, 14 días), **kresoxim metil** (35 días), **tiram** (15 días) o **ziram** (28 días).

CIRUELO

CRIBADO, PULGONES Y ORUGAS

Coryneum beyerinckii, *Myzus persicae* y *Archips spp.*

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es necesario efectuar tratamientos contra cribado con **bitertanol**, **captan**, **dodina**, **mancozeb**,

maneb, **metiram** o **tiram**. En cuanto a pulgones y orugas, si sólo hay pulgones debe utilizarse **imidacloprid** (CONFIDOR-Bayer, COURAZE-Agrodán, GANADOR-Bayer, KOHINOR-Aragonesas) o **pirimicarb** y si hay pulgones y orugas **metomilo**.

ALBARICOQUERO

CRIBADO, OÍDIO, PULGONES Y ORUGAS

Coryneum beyerinckii, *Podosphaera tridactyla*, *Myzus persicae* y *Archips spp.*

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es necesario efectuar tratamientos contra cribado con **bitertanol**,

captan, **clortalonil**, **difenoconazol** (SCORE-Syngenta), **dodina**, **mancozeb**, **maneb**, **metiram** o **tiram**. Si la plantación tiene habitualmente problemas de oídio les recomendamos el uso de **bitertanol** o **difenoconazol** contra ambas enfermedades. En cuanto a pulgones y orugas, si sólo hay pulgones debe utilizarse **imidacloprid**, **pirimicarb** o **tiacloprid** y si hay pulgones y orugas **metomilo**.

CEREZO

CILINDROSPORIOSIS, CRIBADO Y ORUGAS

Cylindrosporium padi, *Coryneum beyerinckii* y *Archips spp.*

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es necesario efectuar tratamientos contra cilindrosporiosis y cribado con **bitertanol**, **captan**, **dodina**, **mancozeb**, **maneb** o **tiram**. Si se observa presencia de orugas enrolladoras de hoja les recomendamos utilizar **metomilo**.

MELOCOTONERO Y NECTARINA

CRIBADO Y OÍDIO

Coryneum beyerinckii y *Sphaerotheca pannosa*

A partir de que hayan caído todos los pétalos es conveniente tratar contra cribado con **bitertanol**, **clortalonil**, **difenoconazol** (SCORE-Syngenta), **dodina**, **mancozeb**, **maneb**, **metiram**, **tiram** o **ziram**. Cuando comience a desprenderse el cáliz, será necesario iniciar los tratamientos contra oídio y continuarlos cada 10-14 días hasta que comience el endurecimiento del hueso utilizando **azufre**, **bitertanol**, **bupirimato** (NIMROD-Aragonesas), **ciproconazol** (CADDY 10 Pepite-Bayer), **difenoconazol** (SCORE-Syngenta), **diniconazol**, **flusilazol** (NUSTAR-DuPont), **miclobutanil** (SYSTHANE-Dow AgroSciences), **penconazol**, **tebuconazol** (FOLICUR-Bayer), **tetraconazol** (DOMARK-Sipcam Inagra), **trifloxistrobin** (FLINT-Bayer) o **triflumizol**.

CULTIVOS EXTENSIVOS

MAÍZ

INSECTOS DE SUELO

Estando próxima la siembra del maíz, se exponen a continuación los productos fitosanitarios autorizados en el cultivo para combatir los insectos de suelo, aplicándose en la mayoría de los casos localizados en la línea de siembra:

Materia activa %	Nombre y Casa comercial	Dosis	Toxicidad	P. S. (1)	Plaga				Otros cultivos extensivos autorizados
					Gusanos grises	Gusanos de alambre	Gusanos blancos	Insectos de suelo	
benfuracarb 8,6	ONCOL 8,6 G-Agrodan	7-10 Kg/ha	Xn, -	-		X	X		Patata, remolacha
carbosulfan 5	MARSHAL 5-Belchim	12 Kg/ha	Xn, -	-		X			Remolacha, girasol, patata
clorpirifos 5	VIARIOS-Varias	40-50 Kg/ha	-/Xn, A	-	X	X	X		Girasol, patata, remolacha
diazinon 10	VIARIOS-Varias	45 Kg/ha 20 Kg/ha en línea de siembra	-/Xn, -	30		X			Patata, remolacha
etoprofos 10	VIARIOS-Varias	60-80 Kg/ha	T/T, -	60	X	X			Patata
deltametrin 2,5	DECIS-Bayer AUDACE-Agrodan	0,3-0,5 l/ha	Xn, B	3	X				Alfalfa
metilclorpirifos 22,4	RELDAN-E-Dow Agrosciences	0,3-0,4 % riego pivot a 3-4 l/ha	Xn, D	15	X				
teflutrin 0,5	FORCE-Syngenta	10-15 Kg/ha	Xn, -	-				X	Girasol, patata, remolacha

- (1) Plazo de seguridad en días

CEREALES DE INVIERNO

ENFERMEDADES FOLIARES

Ante la aparición de enfermedades foliares en los cereales (**trigo, cebada**), se recomienda tratar si se cumplieren los umbrales de tratamiento en los momentos que se exponen en el cuadro adjunto.

Los controles se realizarán en el tallo principal (planta), sobre las 2 últimas hojas emergidas de cada planta. En el caso de mal de pie, se hará sobre todos los tallos de la planta.

Se utilizarán solamente aquellos productos fitosanitarios que estén autorizados en el cultivo contra estas enfermedades.

Enfermedad	Umbral de tratamiento
Entre pleno ahijado y 1 nudo	
Mal de pie	20% de los tallos presentan manchas en las hojas
Entre 2 nudos y zurrón	
Oídio	TRIGO: 25% de plantas con manchas en las hojas CEBADA: 85% de plantas con manchas en las hojas
Roya parda (trigo) Roya enana (cebada)	20% de plantas en cada especie con manchas en las hojas
Septoriosis	25% de las plantas presentan un 10% de la superficie de sus hojas ocupada por el hongo
Rincosporiosis y Helminthosporiosis	100% de las plantas presentan 2 ó 3 manchas en sus hojas
Entre espigado (50% espigas emergidas) y 15 días después	
Oídio, Septoriosis, Rincosporiosis y Helminthosporiosis	50% plantas presentan manchas en hojas y/o espiga

OLIVO

BARRENILLO DEL OLIVO

Phloeotribus scarabeoides

Este parásito que pasa el invierno refugiado entre la corteza, inicia su actividad al subir las temperaturas por encima de los 15°C. En un primer momento se dirige a la copa para alimentarse abriendo galerías que provocan la desecación de brotes.

Cuando la temperatura sube por encima de los 20°C y al oler la madera de poda, buscarán dicha madera para realizar la puesta. Si no la encuentran elegirán ramas rotas o árboles debilitados pudiendo causar su muerte.

Se dejará parte de la leña de poda en la parcela a modo de cebo para que penetre el barrenillo. Dicha leña, se quemará en la segunda quincena de mayo y no antes, con objeto de eliminar la mayor parte de este parásito.

Debido al escalonamiento con el que salen de su refugio invernal y a que se introducen rápidamente en la leña, los tratamientos con fitosanitarios son poco eficaces. No obstante si se toma la decisión de tratar, el único insecticida autorizado el **dimetoato 40%EC**.

Debido al escalonamiento con el que salen de su refugio invernal y a que se introducen rápidamente en la leña, los tratamientos con fitosanitarios son poco eficaces. No obstante si se toma la decisión de tratar, el único insecticida autorizado el **dimetoato 40%EC**.

HORTÍCOLAS

LECHUGA

MILDIU

Bremia lactucae

Las condiciones climatológicas en esta época del año son favorables a los ataques de *mildiu*, siendo muy difícil de controlar una vez que ha invadido la plantación, por lo que les recomendamos cumplir con las siguientes indicaciones:

- 1) Utilizar **planta sana**, libre de mildiu.
- 2) **Tratar preventivamente** desde la implantación del cultivo, preferentemente con un producto sistémico o penetrante.

- 3) Aplicar la **cantidad de caldo suficiente** para mojar bien las plantas (mínimo 450-550 l/ha).
- 4) En cuanto se observen los **primeros síntomas**, tratar necesariamente con un producto **sistémico**.
- 5) **Tratar cada 12-14 días** máximo
- 6) **Alternar los productos**, no repitiendo el mismo más de 3 veces. Salvo otras indicaciones en la etiqueta.
- 7) Respetar rigurosamente el **plazo de seguridad**,

PIMIENTO

BACTERIOSIS

Xanthomonas vesicatoria

En los últimos años, esta enfermedad ha producido pérdidas de cosecha de diversa consideración en Aragón. Se transmite por semilla y puede conservarse sobre restos de cultivo o malas hierbas. En consecuencia, es fundamental:

- No repetir el cultivo de pimiento en parcelas afectadas durante 3-4 años, no plantar tomate.
- No utilizar semilla procedente de parcelas que hayan estado afectadas o próximas a éstas.
- Desinfectar la semilla, en caso de duda, con lejía comercial para uso alimentario al 50%.

Para ello se preparará una disolución de 1 litro de lejía en 4 litros de agua en la que se sumergirá la semilla durante 40 minutos, removiéndola de vez en cuando.

Posteriormente se realizarán 4 lavados con agua limpia, durante 10 cada uno y removiendo también la semilla. Finalmente se secará la semilla.

Es importante no sobrepasar la dosis de lejía ni el tiempo de permanencia de la semilla en la disolución que podrían afectar a su posterior germinación.

ALCACHOFA

TALADRO

Hydroecia xanthenes

A través del contestador automático se ha dado aviso del fin de la eclosión de los huevos, por lo que deben suspenderse los tratamientos contra taladro, ya que en estos momentos ya no son eficaces.

BORRAJA

MANCHA BLANCA

Entyloma serotinum

Dadas las condiciones favorables para esta enfermedad seguir las recomendaciones dadas en el boletín nº 1.

Materia activa	Nombre y Casa comercial	Toxicidad	P. S. (1)
Contacto (acción preventiva)			
compuestos de cobre	VARIOS-Varias	Xn, B	15-21
folpet	VARIOS-Varias	Xn, A/B	21
mancozeb	VARIOS-Varias	Xi/Xn, B	21
maneb	VARIOS-Varias	Xi/Xn, B	21
metiram	POLYRAM-DF- Basf	Xn, -	21
propineb	ANTRACOL-Bayer	Xi/Xn, -	21
folpet + cobre	COVIFET F-Sapac Agro	Xn, B	21
folpet + mancozeb	FL+ KARNAK-Lainco	Xn, -	21
mancozeb + cobre	VARIOS-Varias	Xi/Xn, D/ -	21
maneb + cobre	CUPROFIX-Dequisa	Xn, D	21
propineb + cobre	CUPROSAN PRO-Bayer	Xn, -	21
Penetrantes (acción preventiva y de "stop")			
azoxistrobin	ORTIVA-Syngenta	-,-	7
cimoxanilo + cobre	CUPERTINE-I.Q. Vallés	Xn, A	21
	CURZATE C-Du Pont	Xn, A	21
cimoxanilo + folpet	VARIOS-Varias	Xn, B	21
cimoxanilo + mancozeb	VARIOS-Varias	Xi, B	21
dimetomorf + mancozeb	ACROBAT MZ/WG-Basf	Xi, A/-	7
Sistémicos (acción preventiva y curativa)			
benalaxil + cimoxanilo + folpet	FOBECI-Sipcam Inagra	Xn, A	21
benalaxil + folpet	TAIREL F-Sipcam Inagra	Xn, -	30
benalaxil + mancozeb	GALBEN M-Sipcam Inagra	Xi, -	15
fosetil Al + cimoxanilo + mancozeb	ALMANACH-Bayer	Xi, B	21
fosetil Al + folpet + cimoxanilo	MIKAL PLUS-Bayer	Xn, -	14
metalaxil + mancozeb	CYCO-Afrasa	Xi, A	15
metalaxil M + mancozeb	RIDOMIL GOLD MZ-Syngenta	Xi, -	14
metil tiofanato + mancozeb	FRUMIDOR M-Sipcam Inagra	Xn, B	14
proparmocarb	PROPLANT-I. Q. Vallés	-,- B	21
propamocarb + fosetil Al	PREVICUR Energy-Bayer	-,- A	14

(1) Plazo de seguridad en días.

MEDIDAS PARA LIMITAR LA EXTENSIÓN DE *CLAVIBACTER MICHIGANENSIS* SUBSP. *MICHIGANENSIS* EN TOMATE

Esta bacteria de cuarentena fue detectada, por primera vez en Aragón, en la campaña de 2006. Se transmite por semilla y se propaga fácilmente con las operaciones de atado, poda y recolección, así como por la lluvia y el viento. Se conserva en el suelo, en restos de cosecha, en malas hierbas huéspedes, en tutores, palots, maquinaria e instalaciones contaminadas.

No hay lucha química eficaz para combatir la bacteriosis, siendo todavía más difícil combatir bacterias sistémicas como ésta. El control de la enfermedad debe dirigirse hacia prevención, evitando la introducción, la dispersión y la conservación de la bacteria.

Se deberán utilizar plántulas procedentes de semilleros autorizados y conservar las facturas de compra y los correspondientes pasaportes fitosanitarios durante un año como mínimo. En el caso de semilleros propios,

se deberán utilizar semillas registradas y mantener el envase en su poder un año como mínimo.

El principal síntoma es una marchitez sistémica de la planta. Los primeros síntomas se observan en las hojas más cercanas al suelo, e incluyen la marchitez de los folíolos y el abarquillamiento hacia arriba de los márgenes de éstos. Cortando el tallo longitudinalmente, es posible observar coloraciones marrones en la zona vascular. Un diagnóstico fiable debe realizarse en laboratorio.

La legislación obliga a los particulares, a comunicar al Centro de Protección Vegetal la observación de síntomas sospechosos de la enfermedad, para realizar un diagnóstico fiable en laboratorio.

FORESTALES

PINARES

PROCESIONARIA DEL PINO

Thaumetopoea pityocampa

En este momento la práctica totalidad de las orugas han descendido de los bolsones para enterrarse en las proximidades del árbol, aproximadamente a 15-20 cm de profundidad, donde crisalidan. En este estado, enterradas dentro de un capullo de color rojizo, pueden permanecer desde unos días hasta cuatro años en un fenómeno conocido como diapausa. No existen tratamientos efectivos en esta fase del ciclo biológico.

BARRENADOR DEL PINO SILVESTRE

Ips acuminatus

Los tratamientos contra este escolítido no son efectivos ya que permanece la mayor parte del tiempo, en galerías bajo la corteza del árbol. Por ello, es necesario emplear trampas con feromonas de captura masiva para disminuir su población y los efectos sobre los árboles afectados. El momento adecuado para su colocación coincide con la última semana de marzo.

Recordar que la eficacia de estas trampas es disminuye si en las proximidades quedan restos de leñas o árboles con corteza procedentes de cortas de *Pinus sylvestris* efectuadas después del mes de agosto.

PERFORADORES DE PINOS

Ips sexdentatus

Durante la segunda semana de marzo se colocaron las trampas con feromonas agregativas indicadas para esta especie, en aquellos montes en los que el pasado año se detectaron niveles poblacionales endémicos. A finales del mes de abril deberá incorporarse una nueva feromona, siempre sin retirar la anterior.

GORGOJO PERFORADOR DE PINOS

Pissodes castaneus

Las larvas de este coleóptero perforador han reanudado su actividad durante los meses de marzo y abril, alimentándose del floema de los árboles afectados.

Es fundamental proceder al arranque y eliminación de los pies colonizados por el insecto cuando se detecten síntomas del ataque como puede ser las galerías subcorticales, acículas rojizas y orificios de salida en el tronco con virutas de madera. También se pueden utilizar puntos cebo para disminuir su población y paliar los daños.

CHOPERAS

TALADRO DEL CHOPO

Paranthrene tabaniformis

Durante el mes de abril se debe proceder a la colocación de las trampas de feromona para la captura de insectos adultos. En aquellas plantaciones que precisen tratamientos, la primera aplicación se realizará en el mes de abril. Para conseguir un buen control de las larvas es necesario realizar al menos dos tratamientos antes del mes de agosto.

PULGÓN LANÍGERO DEL CHOPO

Phloeomyzus passerinii

Coincidiendo con el aumento de las temperaturas, las ninfas del pulgón lanífero inician su actividad dando lugar a las primeras generaciones. Para la detección de este insecto se deben observar minuciosamente las grietas de la corteza, donde los insectos han permanecido refugiados durante el invierno y comienzan a aparecer las características ceras como resultado del inicio de su actividad. En el caso de localizar zonas con presencia de pulgones, avisar a los responsables provinciales de Sanidad Forestal.

ORUGA MANCHADA DEL CHOPO

Leucoma salicis

Se aconseja tratar los chopos afectados con los productos autorizados en el mes de abril, coincidiendo con la reanudación de la actividad de las larvas. Estas se alimentan de las hojas provocando importantes defoliaciones del árbol, que disminuyen su capacidad fotosintética y ocasionan pérdidas en la producción de madera.

FRONDOSAS

ZEUZERA

Zeuzera pyrina

En el mes de abril se pueden localizar las larvas, alimentándose en el interior de galerías sobre las ramas y el tronco del árbol. Los ataques de *Zeuzera* son visibles por las ramas afectadas y por las deyecciones que la oruga arroja hacia el exterior de la galería y que tienen un color beige-rojizo característico.

El tratamiento recomendado para el control de este parásito sería la aplicación de un tratamiento con los productos autorizados en el mes de abril y repetirlo en el mes de mayo y otro posterior en la primera semana de julio.

PELIGROSIDAD DE LOS PLAGUICIDAS PARA LAS ABEJAS

Recordamos que en nuestros Boletines les informamos sobre la peligrosidad de los productos para las abejas –segunda letra de la información que aparece en la columna “toxicidad”. A este respecto, insistimos en que los **productos muy peligrosos (letra D) no se pueden utilizar ni en áreas ni en épocas de actividad de las mismas.**

Dirección de Internet: <http://www.aragon.es> - Contestador automático: 976 71 63 87



UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural



Departamento de Agricultura
y Alimentación