

# AVISO FITOSANITARIO



MAYO 2017

CENTRO DE SANIDAD Y CERTIFICACIÓN VEGETAL

www.aragon.es

## Aviso del día 25 de mayo de 2017. Barrenillo Negro (*Hylesinus oleiperda*)

Este es un barrenillo que a diferencia del barrenillo del olivo, pasa prácticamente todo el año en el interior de la madera en forma de larva.

Es en esta época cuando salen los adultos para aparearse y realizar la puesta en las ramas del olivo.

Se realiza un seguimiento de su evolución, ya que es muy importante determinar el momento exacto del tratamiento, para poder controlar al mayor número de individuos adultos.

En estas fechas se está dando el **máximo de vuelo** de este barrenillo.

En las parcelas donde se haya detectado este parásito, es conveniente realizar un tratamiento ahora y pasados 15 días, con alguno de los siguientes productos:

MATERIA ACTIVA	NOMBRE Y CASA COMERCIAL	P.S.	OBSERVACIONES
Betaciflutrin 2,5% SC	BULLDOCK 2.5 SC - Adama BETACIFLUTRIN - Adama	14	Efectuar un máximo de dos aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días y una dosis máxima de 12,5 g s.a./ha.
Deltametrin 2,5% EC	VARIOS - Varias	7	Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,6 l/ha. de producto por aplicación.
Dimetoato 40% EC	VARIOS - Varias	NP	

Alternar los productos, no utilizar dos veces la misma materia activa.

**Seguir en todo momento las indicaciones de la etiqueta del producto.**

En todo momento, puede consultar el [Boletín y las Informaciones Fitosanitarias](#), y en la página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal.