

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TEL. 976 71 63 85 - APARTADO 727 - 50080 ZARAGOZA

PLAGAS DE CUARENTENA

Se considera plaga u organismo de cuarentena a una plaga de importancia económica potencial para un área en peligro, aún cuando dicha plaga no exista o, si existe, no esté extendida y se encuentre bajo control oficial.

Ejemplos de plagas de cuarentena son, entre otros, el fuego bacteriano (*Erwinia amylovora*) en frutales de pepita o el virus de la Sharka (*Plum pox virus*) en frutales de hueso o la podredumbre anular (*Clavibacter michiganensis*) en patata.

Dado que el material vegetal infectado es la principal vía de dispersión, no solamente de éstas sino de otras muchas plagas o

enfermedades, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas por parte de los agricultores:

- 1º Utilizar como material de plantación exclusivamente el procedente de empresas autorizadas, exigiendo y conservando el correspondiente pasaporte fitosanitario.
- 2º Cuando el injerto lo realice el propio agricultor –plantaciones nuevas o reinjertos–, el material vegetal deberá proceder también de viveros autorizados.
- 3º Ante cualquier sintomatología sospechosa deberán ponerse en contacto con el Centro de Protección Vegetal para comprobar la presencia de la enfermedad.

FRUTALES

PERAL

SILA O MIELETA

Psylla piri

Las poblaciones otoñales de sila son elevadas y se prevé un número de adultos invernantes también elevado, razón por la cual es importante efectuar un tratamiento invernal para eliminar el

mayor número posible de adultos antes de que efectúen la puesta de huevos. Para ello les recomendamos el uso de piretroides como **alfa-cipermetrin, beta-ciflutrin, bifentrin, ciflutrin, cipermetrin, deltametrin, esfenvalerato o tau-fluvalinato**.

Normalmente la fecha de tratamiento se sitúa entre el 15 de enero y los primeros días de febrero, dependiendo de las comarcas y de las condiciones climáticas de los meses de diciembre y enero. La fecha exacta se avisará mediante el contestador automático.

HORTÍCOLAS

PATATA

PODREDUMBRE PARDA

Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum

PODREDUMBRE ANULAR

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Estas bacterias, consideradas enfermedades de cuarentena, están presentes en la mayoría de los países de la Unión Europea. Producen importantes pérdidas económicas, tanto en patata de siembra como de consumo, al provocar la pudrición de los tubérculos. Existe un gran riesgo de introducción de éstas enfermedades a través de la patata de siembra.

En almacén, estas bacterias se propagan fácilmente de los tubérculos infectados a los sanos, sin que necesariamente presenten síntomas. Si se siembran tubérculos infectados, dichas bacterias pueden sobrevivir en campo durante varios años.

En campo, la dispersión de las bacterias se produce fácilmente a través de la tierra adherida a los zapatos, maquinaria, aperos o simplemente es transportada por el viento, agua, insectos, etc....

A efectos sanitarios, no se aconseja la práctica del troceado de tubérculos para siembra. En caso de realizarse, deberán utilizarse máquinas troceadoras que tengan prevista la desinfección de la cuchilla de corte entre cada uno de ellos.

Con el fin de prevenir la transmisión de éstas enfermedades, se realizan controles obligatorios a los tubérculos de siembra en origen y son complementados con controles aleatorios en nuestra Comunidad Autónoma.

No obstante, se deben adoptar las siguientes medidas preventivas:

- Bajo ningún concepto sembrar “patata de consumo”.
- Exigir siempre el obligatorio pasaporte fitosanitario que debe estar adherido a los sacos de patata de siembra.
- Si hasta el momento de sembrar observa en la patata de siembra alguna alteración en el anillo vascular (observable al cortar transversalmente los tubérculos) o pudriciones en algún tubérculo, póngase en contacto con el Centro de Protección Vegetal, donde se realizarán análisis que permitan efectuar un adecuado diagnóstico.



UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural



Departamento de Agricultura
y Alimentación

VID

NECROSIS BACTERIANA

Xylophilus ampelinus

ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA MADERA

Durante el periodo invernal y coincidiendo con las labores de poda, es una buena época para detectar, corregir o prevenir enfermedades de la viña como la necrosis bacteriana (*Xylophilus ampelinus*) y enfermedades fúngicas de la madera. Como no exis-

ten en el mercado productos curativos registrados que controlen estas enfermedades se debe recurrir a la aplicación de tratamientos preventivos para evitar tanto su implantación como su difusión. La incidencia de enfermedades fúngicas de la madera, está aumentando considerablemente, tanto en viñas viejas como en plantaciones jóvenes.

Las medidas recomendadas para el control de estas enfermedades son las siguientes:

	Controles culturales	Controles químicos
NECROSIS BACTERIANA	<ul style="list-style-type: none"> - Cuando el ataque en la parcela sea pequeño, se arrancarán y quemarán las cepas afectadas. - En los viñedos enfermos, realizar la poda en la época de máximo reposo vegetativo (enero-febrero), empezando por las cepas sanas. - Las tijeras de poda se desinfectarán entre cepa y cepa, para no transmitir la enfermedad. La desinfección se puede hacer con lejía comercial diluida en agua al 50% o con alcohol. - Los sarmientos deben recogerse y quemarse. - En las viñas afectadas no es recomendable el empleo de cosechadoras ni prepodadoras. 	<p>Inmediatamente después de la poda, cuando las heridas estén todavía frescas, aplicar algunos de los siguientes productos: hidróxido cúprico, oxiclورو de cobre, óxido cuproso, sulfato cuprocálcico o sulfato de cobre, a la dosis de 500 g de cobre metal por hectolitro.</p>
ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA MADERA	<ul style="list-style-type: none"> - Arrancar y quemar las cepas afectadas. - Reponer las marras con material de plantación sano. - Evitar las podas muy severas. - Realizar la poda lo más tarde posible. - Los cortes de poda se harán verticales al suelo. 	<p>cubiet (aplicado después de la poda sobre los cortes en pulverización) quinosol (aplicado después de la poda sobre los cortes en pulverización) tebuconazol + resinas sintéticas (aplicado después de la poda sobre los cortes con pincel)</p>

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREALES DE INVIERNO

PULGONES Y VIRUS DEL ENANISMO AMARILLO DE LA CEBADA (BYDV)

El Virus del enanismo amarillo de la cebada, Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) origina en las plantas, un sistema radicular reducido, una parte aérea enanizada y amarilla, granos más pequeños, sumidos y de mala calidad.

Se transmite por pulgones de forma persistente, y por lo tanto está asociado a la presencia de pulgones en el cultivo. La presencia de pulgones en otoño-invierno implica infecciones tempranas, con síntomas severos de enanismo y clorosis. Infecciones tardías permiten el desarrollo normal de la planta, con síntomas de clorosis en las hojas superiores.

El riesgo de ataques por pulgones está favorecido por las siembras tempranas y las condiciones climáticas suaves. Se recomienda realizar tratamientos químicos con piretroides autorizados, entre el estado de 3 hojas e inicio de ahijado del cereal, cuando se observan el 10% de las plantas colonizadas con al menos un pulgón, cuando la temperatura sea superior a 5-6 °C.

Productos autorizados para pulgones en cereales de invierno

Materia activa	Nombre y Casa comercial	Toxicidad	P.S. (1)
alfa cipermetrin	VARIOS-Varias	Xi/Xn, C	21
azufre+fenitrotion (2) (*)	FENIZUFRE-Dequisa	Xi, D	15
deltametrin	VARIOS-Varias	Xn, C	7
esfenvalerato (3)	VARIOS-Varias	Xn, C	28
esfenvalerato + fenitrotion (*)	VARIOS-Varias	Xn, D	28
fenitrotion (*)	VARIOS-Varias	Xn, D	15
fosalon (*)	ZOLONE-Agrodan	Xn/T, B	15
malation (4) (*)	VARIOS-Varias	Xi/Xn, D	7
metil pirimifos	ACTELLIC-Syngenta	Xn/-, D/-	7
pirimicarb	VARIOS-Varias	Xn/T, A	45

(1) Plazo de seguridad en días

(2) Autorizado y comercializado para cebada y trigo

(3) Autorizado y comercializado para avena, cebada, centeno y trigo

(4) Autorizado y comercializado para cebada y trigo

(*) Estas materias activas dejarán de comercializarse durante el 2008

FORESTALES

PINARES

COCHINILLA DEL PINO

Matsucoccus feytaudi

Este insecto se alimenta succionando la savia de los árboles, lo que induce una resinación sobre el tronco y la presencia de acículas rojizas en los ramillos inferiores. En el mes de diciembre se pueden observar las pupas del macho, pequeños capullos blancos sobre las grietas de la corteza.

PROCESIONARIA DEL PINO

Thaumetopoea pityocampa

En estas fechas son fácilmente reconocibles los grandes bolsones blancos donde las orugas soportan las bajas temperaturas. En zonas en las que sea necesario su control, especialmente en parques y jardines y en zonas frecuentadas por personas y animales domésticos, se pueden realizar tratamientos químicos dirigidos al bolsón o cortar y destruir los bolsones con extrema precaución. Las orugas se encuentran en cuarto/quinto estadio y poseen sus pelos urticantes muy desarrollados.

EL MUÉRDAGO

Viscum album

Esta planta hemiparásita se localiza principalmente en pinos y abetos, afectando también a diversas frondosas como chopos, acacias y tilos entre otras. En muchas comarcas constituye un problema importante por su extensión y por el debilitamiento que provoca en los árboles huéspedes, ante fenómenos de estrés hídrico. Se deben eliminar periódicamente las ramas afectadas por muérdago para disminuir la colonización de otros árboles.

CHOPERAS

MARCHITAMIENTO FOLIAR DEL CHOPO

Marssonina brunnea

Este hongo causa una grave enfermedad en los chopos, provocando una clorosis en las hojas al comienzo de la brotación, seguida de una decoloración y finalmente una defoliación del árbol. Esto supone una importante merma de crecimiento, la reducción de la producción de madera y el debilitamiento general de la planta, convirtiéndola en susceptible para el ataque posterior de otros patógenos. Durante el invierno la forma sexual del hongo se conserva en forma de estromas sobre las hojas caídas o en forma de acérvulos sobre los brotes apicales del año anterior.

QUERCUS

ORUGA DE LIBREA

Malacosoma neustria

Las orugas de este lepidóptero se alimentan vorazmente de las hojas tiernas de las encinas, reduciendo la producción de frutos y el crecimiento del árbol. Invernan en estado de huevo, siendo un fácil elemento de diagnóstico la presencia de masas de huevos cilíndricos alrededor de los ramillos. En primavera aparecen las orugas que en estadios más avanzados se vuelven gregarias y tejen bolsones.

OTROS

AVISPILLA DEL CASTAÑO

Dryocosmus kuriphilus

Este organismo considerado parásito de cuarentena en la Unión Europea, se considera la plaga más peligrosa del mundo para el castaño, disminuye su fructificación y en casos extremos puede provocar la muerte de los árboles afectados. Durante los meses de invierno, las larvas se desarrollan en el interior de las yemas e inducen la formación de agallas. Estos cuerpos globosos, originados por la deformación de los tejidos, tienen entre 5 y 20 mm de diámetro y son de colores variados desde verde a rosado. Su aparición es fundamental para detectar la presencia de este insecto.

HERBICIDAS EN CEREALES

imazametabenz (ASSERT-Basf): a partir del 31 de diciembre de 2007, **se retira** definitivamente la **autorización** para el uso de esta sustancia activa contra avena loca, en cebada, avena y triticale.

NOTA: Les recordamos que la única posibilidad de comprobar en cada momento si un producto fitosanitario está autorizado para un determinado uso –cultivo y plaga– es la consulta de la página web del MAPA (www.mapa.es/es/agricultura/agricultura.htm).

ÍNDICE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES OBJETO DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Introducción: 1
Comercialización y utilización de productos fitosanitarios: 5, 9, 10, 11, 12
Impacto ambiental de los herbicidas: 3, 6
Peligrosidad de los herbicidas para las abejas: 5
Plagas de cuarentena: 16
Registro de datos de aplicaciones de productos fitosanitarios: 9
Roedores (Topillos): 1, 14
Tratamientos después del granizo: 11

CULTIVOS EXTENSIVOS

Orugas defoliadoras: 11
ALFALFA
Apion: 4, 14
Gusano verde: 4, 8, 9
Pulgones: 4, 11
Pulguilla: 4
ARROZ
Algas: 8
Gusanos anélidos: 8
Larvas de dípteros: 8
CEBADA
Influencia de la fecha de siembra: 14
Mosquito del cereal: 14
Zabrus: 14
CEREALES DE INVIERNO
Calamobius filum: 14
Cephus pygmaeus: 14
Enfermedades foliares: 5

Herbicidas: 2, 13, 15
Pulgones: 16
Trachelus tabidus: 14
Virus del enanismo amarillo de la cebada: 16

GIRASOL

Herbicidas: 6

MAÍZ

Fumonisinas: 7
Herbicidas: 7
Insectos de suelo: 5

TRIGO

Influencia de la fecha de siembra: 14
Mosquito del cereal: 14
Zabrus: 14

FORESTALES

ABETOS

Epinotia subsequana: 9
CASTAÑOS
Dryocosmus kuriphilus: 16

CEDROS

Cinara cedri: 8

CHOPERAS

Brenneria sp: 10
Cryptorhynchus lapathi: 1, 4, 14
Gypsonoma aceriana: 8, 11
Leucoma salicis: 12
Marssonina brunnea: 16
Paranthrene tabaniformis: 5, 9
Phrathora laticollis: 8, 9
Phloeomyzus passerinii: 1, 11, 12, 14
Pterocomma populeum: 10

CIPRESES

Phloeosinus thujae: 14
Seiridium cardinale: 12

FRESNOS

Abraxas pantaria: 13

FRONDOSAS

Brenneria quercinea: 1
Diplodia mutila: 12
Euproctis chrysorrhoea: 11
Lymantria dispar: 9, 11
Tortix viridana: 4

OLMOS

Ophiostoma novo-ulmi: 11
Xanthogalerucella luteola: 9, 10, 11, 13

ORNAMENTALES

Armillaria: 5

PALMERAS

Rhynchophorus ferrugineus: 13

PINARES

Aphrophora corticea: 12
Dioryctria splendidella: 1
Diprion pini: 8
Fusarium circinatum: 14
Ips acuminatus: 4, 5, 8, 9, 10, 11
Ips sexdentatus: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Matsucoccus feytaudi: 16
Orthotomicus erosus: 4, 13
Pissodes castaneus: 5
Rhyacionia buoliana: 8, 11
Sphaeropsis sapinea: 16
Thaumetopoea pityocampa: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
Tomicus piniperda: 1, 4, 12, 13, 14
Viscum album: 16

PLÁTANOS DE SOMBRA

Apiognomonía veneta: 12
Corythuca ciliata: 9, 11

QUERCUS

Coroebus florentinus: 14
Euproctis chysorrhoea: 14
Malocosoma neustria: 16

SABINAS

Gelechia senticetella: 8

SAUCES

Marssonina salicaceae: 13

FRUTALES

Araña roja: 8
Cossus: 10
Enfermedades de conservación: 11
Enfermedades en general: 11, 12
Gusano cabezudo: 10
Herbicidas: 3
Mantenimiento de suelos: 3
Mosca de la fruta: 10, 11, 12, 13
Piojo de San José: 4, 10, 13
Roya: 9
Tratamiento de otoño: 14

FRUTALES DE HUESO

Anarsia: 10
Gusano cabezudo: 12
Monilia: 10
Polilla oriental: 10
Roya: 10

ALBARICOQUERO

Anarsia: 4
Cribado: 5, 9
Oídio: 5
Orugas: 5, 9
Pulgones: 5, 9

ALMENDRO

Anarsia: 4
Cribado: 8, 9
Mancha ocre: 4, 8, 9
Orugueta del almendro: 4
Pulgón verde: 4, 5

CEREZO

Cilindrosporiosis: 8, 9
Cribado: 5, 8, 9
Mosca de la cereza: 9, 10
Orugas defoliadoras: 5, 8, 9
Pulgones: 5, 8, 9
Tratamiento prefloral: 4

CIRUELO

Carpocapsa: 9
Cribado: 5, 9
Orugas: 5
Pulgones: 5, 9
Tratamiento prefloral: 4

MANZANO

Agusanado o barreno: 8, 9, 10, 11, 12
Fuego bacteriano: 11
Minadoras de hoja: 13
Moteado: 4, 5, 8, 9, 10
Oídio: 4, 8, 9
Orugas de la piel: 5

Pulgón oscuro: 4
Zeuzera: 10

MELOCOTONERO

Abolladura o lepra: 1, 5
Anarsia: 4, 9, 12
Cribado: 5, 8, 9
Oídio: 5, 8, 9
Plateado de los frutos: 10
Polilla oriental: 9, 12
Pulgón verde: 4, 5, 8

NECTARINA

Abolladura o lepra: 1, 5
Anarsia: 4, 9, 12
Cribado: 5, 8, 9
Oídio: 5, 8, 9
Plateado de los frutos: 10
Polilla oriental: 9, 12
Pulgón verde: 4, 5, 8

NOGAL

Agusanado o barreno: 10, 12

PERAL

Agusanado o barreno: 8, 9, 10, 11, 12
Filoxera: 10
Fuego bacteriano: 11
Hoplocampa: 5
Minadoras de hoja: 8
Moteado: 5, 8, 9, 10
Orugas de la piel: 5
Pulgón oscuro: 5
Seudomonas: 1, 4,
Sila o mieleta: 1, 5, 8, 9, 10, 16
Zeuzera: 10

HORTÍCOLAS

Araña amarilla: 10
Desinfección de semilleros: 1
Desinfección de suelos:
Biofumigación: 10
Solarización: 10
Esclerotinia: 1
Gusanos grises: 10
Pulgones: 9

ACELGA

Pulguilla: 11

ALCACHOFA

Oidiopsis: 9, 13
Pulgones: 9
Taladro: 1, 4, 5, 8

BORRAJA

Mancha blanca: 1, 5
Oídio: 1, 13, 14

CEBOLLA

Herbicidas: 6

COLES

Mosca blanca: 11, 12, 13
Mosca de la col: 13
Orugas: 11, 12, 13, 14
Pulgones: 12, 13
Pulguilla: 11
Taladro del tallo: 12

ESPÁRRAGO

Crioceris: 9, 10
Desinfección de zarpas: 4

Insectos de suelo: 4
Roya: 12, 13
Taladro: 9, 10

LECHUGA

Botritis: 14
Esclerotinia: 14
Mildiu: 5, 9, 13, 14
Orugas: 13
Virus del bronceado: 13, 14

PATATA

Desinfección de los tubérculos para siembra: 4
Escarabajo: 9, 10
Herbicidas: 3
Mildiu: 9, 10
Podredumbre anular: 4, 16
Podredumbre parda: 4, 16
Polilla: 10, 11, 12

PIMIENTO

Xanthomonas vesicatoria: 5, 12
Herbicidas: 6
Oidiopsis: 12, 13
Taladro: 12, 13
Tristeza o seca: 10, 11

SEMILLEROS

Desinfección de semilleros: 1

TOMATE

Araña amarilla: 11
Pseudomonas syringae: 9, 10
Clavibacter michiganensis: 5, 9, 10, 12
Eriófidos: 11
Herbicidas: 6
Mildiu: 9, 10
Necrosis apical: 11
Oidiopsis: 11, 12
Podredumbre de frutos: 12
Taladro: 10, 11, 12

OLIVO

Agusanado: 9
Barrenillo: 5, 9
Cochinilla: 8, 12, 13
Herbicidas: 3
Mantenimiento de suelos: 3
Mosca: 10, 12, 13
Negrilla o tizne: 8, 12, 13
Polilla del jazmín: 8, 9
Prays: 8, 9
Pseudomonas savastanoi Smith: 1, 4
Repilo del olivo: 4, 13

VID

Acariosis: 8
Araña amarilla: 10
Enfermedades fúngicas de la madera: 16
Herbicidas: 3
Mantenimiento de suelos: 3
Mildiu: 9, 10, 12
Necrosis bacteriana: 16
Oídio: 8, 12
Piral: 8
Podredumbre gris: 11, 12
Polilla del racimo: 11, 12

Dirección de Internet: <http://www.aragon.es> - Contestador automático: 976 71 63 87

Imprime: Gráficas Mola, s.c.l. • Depósito Legal: Z-1.328/85



UNION EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

GOBIERNO
DE ARAGON

Departamento de Agricultura
y Alimentación